

憶思能貼片使用教學

1. 憶思能貼片適應症：

輕度至中度阿茲海默症之癡呆(失智)症。

2. 憶思能貼片使用說明：

1. 沿虛線剪開封袋，打開後取出貼片（見圖 B）。保留封袋稍後使用。剪切時避免損及貼片或過度凹折貼片。

圖 B



2. 貼片的黏性面（接觸面）覆蓋有保護膜片。將保護膜片的一邊剝開，請勿讓您的手指碰觸貼片的黏性面（見圖 C）。

圖 C



3. 將貼片的黏性面貼在您所選擇的皮膚部位。
4. 將保護膜片的另一邊剝開（見圖 D）。

圖 D



5. 按緊貼片，確保各邊緊密黏附（見圖 E）。

圖 E




3. 憶思能貼片使用部位：

(1)穿合身衣服時，貼片應避免貼在會被磨掉的部位。

(2)使用前，確認您的皮膚是：

- A. 清潔、乾燥和無毛髮。
- B. 沒有塗抹粉末、油、保濕劑或乳液。
- C. 無割傷、皮疹及/或受到刺激。

每天在以下各部位中擇一貼上一片貼片



4. 注意事項：

(1)請確實**遵照醫師指示**，即使其指示和此說明書刊載內容不同。

(2)可用筆在『憶思能』貼片上註記貼片使用時間

(3)更換貼片時，新貼片**要貼在不同部位**的皮膚，(如：第一天貼在身體右側，然後第二天貼在身體左側)。

(4)同一個點在**14天內不要重複貼**，**一次只能貼一片**。

(5)**每24小時更換**新的貼片。

(6)本藥品**不可給兒童使用**。

5. 如何移除憶思能貼片？

輕輕拉起憶思能貼片邊緣，然後整片慢慢從皮膚上撕下。

6. 常見問題：

- (1)洗澡、游泳或淋浴時不影響貼片，須確保貼片不會在活動中脫落。
- (2)貼片不可長時間暴露在外部的熱源(過度日曬、三溫暖、日光浴)。
- (3)為達到藥品的治療效益，應每天更換一片新的貼片，若數日未使用，亦應告訴照護者。
- (4)若貼過多的憶思能貼片，應將所有貼片撕下，並通知醫師，使用過多貼憶思能時，可能會有噁心、嘔吐、腹瀉、高血壓及幻覺的現象，也可能發生心跳變慢及暈倒。
- (5)若忘記貼憶思能貼片時，立刻貼上新的貼片，隔天給藥時間，再換新的貼片。
 - A. 不可貼兩片來補償忘記的劑量。
 - B. 如果數日都未使用貼憶思能片，在未和醫師討論前不可使用貼片。